【成人】COVID-19 経口抗ウイルス薬 院内フォーミュラリー

発症5日目までの患者を対象とする ※ゾコーバは発症3日目までに投与開始

ワクチン接種回数2回以下の患者

リスク因子≧3

第一推奨：パキロビッド

eGFR（ml/min）≧60：通常量
59～30：減量
＜29：推奨しない
併用禁忌薬剤多数
処方前に薬剤部へ相談

第二推奨：ラゲブリオ

妊婦は禁忌

リスク因子＜3

発熱以外の全身症状あり

→ 第一推奨：パキロビッド

発熱のみ

ゾコーバを検討
併用禁忌薬剤多数
処方前に薬剤部へ相談
妊婦は禁忌

主な重症化のリスク因子：
65歳以上、悪性腫瘍、慢性呼吸器疾患、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、脂質異常症、心血管疾患、脳血管疾患、BMI≧30、喫煙、固形臓器移植後の免疫不全、妊娠後半期、免疫抑制・調節薬の使用、HIV感染症

【各薬剤の適応】
ゾコーバ：12歳以上の小児及び成人
パキロビット：成人及び12歳以上かつ体重40kg以上の小児
ラゲブリオ：18歳以上

作成：福岡赤十字病院フォーミュラリー検討部会、感染症内科
（薬事委員会承認：2023年7月13日 初版）

【成人】COVID-19 経口抗ウイルス薬 院内フォーミュラリー

発症5日目までの患者を対象とする ※ゾコーバは発症3日目までに投与開始

ワクチン接種回数3回以上の患者

リスク因子≧3

第一推奨：パキロビッド

eGFR（ml/min）≧60：通常量
59～30：減量
＜29：推奨しない
併用禁忌薬剤多数
処方前に薬剤部へ相談

第二推奨：ラゲブリオ

妊婦は禁忌

リスク因子＜3

強い全身倦怠感
咽頭痛で食事制限

ゾコーバを検討
併用禁忌薬剤多数
処方前に薬剤部へ相談
妊婦は禁忌

発熱のみ

対症療法で可

Pt.が抗ウイルス薬を希望

ゾコーバを検討
併用禁忌薬剤多数
処方前に薬剤部へ相談
妊婦は禁忌

若年者で重症化リスクなし

対症療法にて自宅療養
検査結果を待たずに帰宅可

主な重症化のリスク因子：
65歳以上、悪性腫瘍、慢性呼吸器疾患、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、脂質異常症、心血管疾患、脳血管疾患、BMI≧30、喫煙、固形臓器移植後の免疫不全、妊娠後半期、免疫抑制・調節薬の使用、HIV感染症

【各薬剤の適応】
ゾコーバ：12歳以上の小児及び成人
パキロビット：成人及び12歳以上かつ体重40kg以上の小児
ラゲブリオ：18歳以上

作成：福岡赤十字病院フォーミュラリー検討部会、感染症内科
（薬事委員会承認：2023年7月13日 初版）

【成人】COVID-19 経口抗ウイルス薬 院内フォーミュラリー

FM 23-2-1

発症5日目までの患者を対象とする※ゾコーバは発症3日目までに投与開始



主な重症化のリスク因子：
65歳以上、悪性腫瘍、慢性呼吸器疾患、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、脂質異常症、心血管疾患、脳血管疾患、BMI≧30、喫煙、固形臓器移植後の免疫不全、妊娠後半期、免疫抑制・調節薬の使用、HIV感染症　9）

【各薬剤の適応】
ゾコーバ：12歳以上の小児及び成人
パキロビット：成人及び12歳以上かつ体重40kg以上の小児
ラゲブリオ：18歳以上

1) Impact of COVID-19 in solid organ transplant recipients. Am J Transplant. 2021;21:925-937

2) COVID-19 (SARS-CoV-2) in lymphoma patients: A review. World J Virol 2021 November 25; 10(6):213-325

3) Impact of rituximab on COVID-19 outcome. Annals of Hematology (2021) 100:2805-2812

4) Protracted severe COVID-19 pneumonia following rituximab treatment: caution needed. Rheumatology international (2021) 41:1839-1843

5) 福岡市コロナ会議による専門家の意見より、ワクチン接種回数≧3をカットオフ値とした。

6) 厚生労働省　第49回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード（令和3年8月25日）資料4-3「 重症化リスク因子の保有数と致死率」より、リスク因子≧3をカットオフ値にした。

7) パキロビッド（EPIC-HR)とラゲブリオ（MOVe-OUT)の臨床試験より、重症化の相対リスク減少率が高いパキロビッドを第一選択とした。

8) ゾコーバの臨床試験（T1221試験）において、omicron株流行期に共通してみられる特徴的な5症状をプラセボ群と比較して約24時間短縮させた。

9) 新型コロナウイルス感染症診療の手引き（厚生労働省）

作成：福岡赤十字病院フォーミュラリー検討部会、感染症内科

（薬事委員会承認：2023年7月13日 初版）