

福岡赤十字病院 院内フォーミュラー FM 23-4-1

高カリウム血症治療薬（内服薬）

医療経済等を考慮し、原則第一推奨薬を使用する。
ただし、以下に該当する場合には、ロケルマの使用を検討

1. 速やかに高カリウム血症を是正したい
2. CaやMgを低下させたくない
3. 腎障害がない高カリウム血症を是正したい
4. 便秘がひどく、第一推奨薬を使うのが躊躇われる

※判断に迷うときは専門医に相談すること



条件付推奨薬



第一推奨薬

	非ポリマー性陽イオン交換化合物	陽イオン交換樹脂	
製品名	ロケルマ懸濁用散分包	ケイキサレート散 ケイキサレートドライシロップ	カリメート経口液 ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー
一般名	ジルコニウムシクロケイ酸水和物	ポリスチレンスルホン酸Na	ポリスチレンスルホン酸Ca
剤形	懸濁用散 5g 懸濁用散 10g	散 5g ドライシロップ 3.27g	経口液20% 25g 経口ゼリー20% 25g
効能・効果	高カリウム血症	急性及び慢性腎不全に伴う高カリウム血症	
陽イオン含有量	Na : 80mg / g	Na : 100mg / g	Ca : 70~90mg / g
使用方法	開始用量 : 10g × 3回 2日間 (3日間まで) 維持用量 : 5g-15g × 1回 透析の場合 : 非透析日に5g-15g × 1回	内服 : 30g/日 分2-3 注腸 (散のみ適応) : 1回 30g	15-30g/日 分 2-3
禁忌	該当なし	該当なし	腸閉塞
併用注意	抗HIV治療薬 アゾール系抗真菌薬 チロシンキナーゼ阻害薬 タクロリムス	ジギタリス製剤 アルミニウム、マグネシウムまたはカルシウムを含有する制酸剤・緩下剤 甲状腺ホルモン製剤	
重大な副作用	低カリウム血症 (11.5%) うっ血性心不全 (0.5%)	心不全誘発、腸管穿孔、腸潰瘍、腸壞死 (いずれも頻度不明)	腸管穿孔、腸閉塞、大腸潰瘍 (いずれも頻度不明)
1日薬価の目安	1042.1円~3126.3円	351円~387円	184.2円~396.6円