

# 福岡赤十字病院 院内フォーミュラー FM 23-4-2

## 高カリウム血症治療薬（内服薬）

医療経済等を考慮し、原則第一推奨薬を使用する。  
ただし、以下に該当する場合には、ロケルマの使用を検討

1. 速やかに高カリウム血症を是正したい
2. CaやMgを低下させたくない
3. 腎障害がない高カリウム血症を是正したい
4. 便秘がひどく、第一推奨薬を使うのが躊躇われる

※判断に迷うときは専門医に相談すること



**条件付推奨薬**



**第一推奨薬**

	非ポリマー性陽イオン交換化合物	陽イオン交換樹脂	
製品名	ロケルマ懸濁用散分包	ケイキサレードドライシロップ	カリメート経口液 ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー
一般名	ジルコニウムシクロケイ酸水和物	ポリスチレンスルホン酸Na	ポリスチレンスルホン酸Ca
剤形	懸濁用散 5g 懸濁用散 10g	ドライシロップ 3.27g	経口液20% 25g 経口ゼリー20% 25g
効能・効果	高カリウム血症	急性及び慢性腎不全に伴う高カリウム血症	
陽イオン含有量	Na:80mg / g	Na:100mg / g	Ca:70~90mg / g
使用方法	開始用量:10g×3回 2日間(3日間まで) 維持用量:5g-15g×1回 透析の場合:非透析日に5g-15g×1回	1日30g 分2-3	1日15-30g 分2-3
禁忌	該当なし	該当なし	腸閉塞
併用注意	抗HIV治療薬 アゾール系抗真菌薬 チロシナーゼ阻害薬 タクロリムス	ジギタリス製剤 アルミニウム、マグネシウムまたはカルシウムを含有する制酸剤・緩下剤 甲状腺ホルモン製剤	
重大な副作用	低カリウム血症(11.5%) うつ血性心不全(0.5%)	心不全誘発、腸穿孔、腸潰瘍、腸壊死（いずれも頻度不明）	腸管穿孔、腸閉塞、大腸潰瘍（いずれも頻度不明）
1日薬価の目安	1,024.3円~3,072.9円	321.8円	233.4円~466.8円