

+ 福岡赤十字病院がん化学療法レジメン一覧

改訂日：2025年11月17日

診療科： 外科

癌種： 胆道癌

レジメン名： TS-1単剤療法（術後補助）

投与スケジュール： 6週間毎（4コース）又は3週毎（8コース）

抗癌剤（一般名）

オテラシルカリウム ギメラシル テガフル

標準投与量

80 mg/body

投与方法

経口投与

投薬日

day1-28（6週毎）

BSA1.25m²未満

オテラシルカリウム ギメラシル テガフル

100 mg/body

経口投与

day1-28（6週毎）

BSA1.25m²以上1.5m²未満)

オテラシルカリウム ギメラシル テガフル

120 mg/body

経口投与

day1-28（6週毎）

BSA1.5m²以上

オテラシルカリウム ギメラシル テガフル

80 mg/body

経口投与

day1-14（3週毎）

BSA1.25m²未満

オテラシルカリウム ギメラシル テガフル

100 mg/body

経口投与

day1-14（3週毎）

BSA1.25m²以上1.5m²未満)

オテラシルカリウム ギメラシル テガフル

120 mg/body

経口投与

day1-14（3週毎）

BSA1.5m²以上

レジメン名： GEM単剤療法

投与スケジュール： 4週間毎

抗癌剤（一般名）

ゲムシタビン塩酸塩

標準投与量

1000 mg/m²

投与方法

点滴静注

投薬日

day1,8,15

レジメン名： CDDP+GEM療法

投与スケジュール： 3週間毎

抗癌剤（一般名）

シスプラチニ

標準投与量

25 mg/m²

投与方法

点滴静注

投薬日

day1,8

ゲムシタビン塩酸塩

1000 mg/m²

点滴静注

day1,8

レジメン名： CDDP+GEM+Durvalumab療法

投与スケジュール： 3週間毎

抗癌剤（一般名）

デュルバリマブ

標準投与量

1500 mg/body

投与方法

点滴静注

投薬日

day1

シスプラチニ

25 mg/m²

点滴静注

day1,8

ゲムシタビン塩酸塩

1000 mg/m²

点滴静注

day1,8

レジメン名：CDDP+GEM+Durvalumab療法

投与スケジュール：3週間毎 *9サイクル以降はデュルバーレマブ

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ゲムシタビン塩酸塩	1000 mg/m ²	点滴静注	day1,8
シスプラチン	25 mg/m ²	点滴静注	day1,8
デュルバーレマブ	1500 mg/body	点滴静注	day1
デュルバーレマブ	1500 mg/body	点滴静注	

レジメン名：GEM+TS-1療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ゲムシタビン塩酸塩	1000 mg/m ²	点滴静注	day1,8
オテラシルカリウム ギメラシル テガフル	80 mg/m ²	経口投与	day1~14