

福岡赤十字病院がん化学療法レジメン一覧

改訂日：2025年11月17日

診療科： 産婦人科

癌種： 子宮体癌

レジメン名： CBDCA+PTX+Durvalumab(±Olaparib)療法

投与スケジュール： 3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
デュルバルマブ	1120 mg/body	点滴静注	day1
パクリタキセル	175 mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチニ	5~6 =AUC	点滴静注	day1

レジメン名： CBDCA+PTX+Pembrolizumab療法

投与スケジュール： 3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注	day1
パクリタキセル	175 mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチニ	5 =AUC	点滴静注	day1

レジメン名： TC療法

投与スケジュール： 3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
パクリタキセル	175~180 mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチニ	5~6 =AUC	点滴静注	day1

レジメン名： Weekly TC療法

投与スケジュール： 4週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
パクリタキセル	60~80 mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
カルボプラチニ	2 =AUC	点滴静注	day1,8,15

レジメン名： CBDCA+Weekly PTX療法

投与スケジュール： 4週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
パクリタキセル	60~80 mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
カルボプラチニ	5~6 =AUC	点滴静注	day1

レジメン名： DC療法

投与スケジュール： 3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ドセタキセル水和物	60~70 mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチニ	5~6 =AUC	点滴静注	day1

レジメン名：AP療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ドキソルビシン塩酸塩	45~60 mg/m ²	点滴静注	day1
シスプラチニ	50 mg/m ²	点滴静注	day1

レジメン名：Weekly Paclitaxel単剤療法

投与スケジュール：4週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
パクリタキセル	80 mg/m ²	点滴静注	day1,8,15

レジメン名：Monthly Paclitaxel単剤療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
パクリタキセル	180 mg/m ²	点滴静注	day1

レジメン名：Docetaxel単剤療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ドセタキセル水和物	70 mg/m ²	点滴静注	day1

レジメン名：ADM単剤療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ドキソルビシン塩酸塩	60 mg/m ²	点滴静注	day1

レジメン名：Pembrolizumab【200mg/3週間毎】+Lenvatinib療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注	day1
レンバチニブメシリ酸塩	20 mg/body	経口投与	連日

レジメン名：Pembrolizumab【400mg/6週間毎】+Lenvatinib療法

投与スケジュール：6週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ペムブロリズマブ	400 mg/body	点滴静注	day1
レンバチニブメシリ酸塩	20 mg/body	経口投与	連日

レジメン名：TC(CBDCA脱感作) 療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
パクリタキセル	175～180 mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチニ	総量×0.001 mg/body	点滴静注	day1
カルボプラチニ	総量×0.01 mg/body	点滴静注	day1
カルボプラチニ	総量×0.1 mg/body	点滴静注	day1
カルボプラチニ	5～6 =AUC	点滴静注	day1
上記を除いた分			