

福岡赤十字病院がん化学療法レジメン一覧

改訂日：2025年11月17日

診療科： 産婦人科

癌種： 子宮頸癌

レジメン名：Tisotumab Vedotin単剤療法

投与スケジュール： 3週毎

抗癌剤（一般名）

チソツマブベドチン

標準投与量

2 mg/kg

投与方法

点滴静注

投薬日

day1

レジメン名：Pembrolizumab+CCRT (weekly-CDDP)

投与スケジュール： 下記参照（放射線療法中）

放射線併用

抗癌剤（一般名）

シスプラチニ

標準投与量

40 mg/m²

投与方法

点滴静注

投薬日

day1,8,15,22,29,36

ペムブロリズマブ

200 mg/body

点滴静注

day1,22

レジメン名：TC療法

投与スケジュール： 3週間毎

抗癌剤（一般名）

パクリタキセル

標準投与量

175～180 mg/m²

投与方法

点滴静注

投薬日

day1

カルボプラチニ

5～6 =AUC

点滴静注

day1

レジメン名：TC+bevacizumab療法

投与スケジュール： 3週間毎

抗癌剤（一般名）

パクリタキセル

標準投与量

175～180 mg/m²

投与方法

点滴静注

投薬日

day1

カルボプラチニ

5～6 =AUC

点滴静注

day1

ベバシズマブ

15 mg/kg

点滴静注

day1

レジメン名：Weekly TC療法

投与スケジュール： 4週間毎

抗癌剤（一般名）

パクリタキセル

標準投与量

60～80 mg/m²

投与方法

点滴静注

投薬日

day1,8,15

カルボプラチニ

2 =AUC

点滴静注

day1,8,15

レジメン名：CBDCA+Weekly PTX療法

投与スケジュール： 4週間毎

抗癌剤（一般名）

パクリタキセル

標準投与量

60～80 mg/m²

投与方法

点滴静注

投薬日

day1,8,15

カルボプラチニ

5～6 =AUC

点滴静注

day1

レジメン名：DC療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ドセタキセル水和物	60～70 mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチニ	5～6 =AUC	点滴静注	day1

レジメン名：DC+bevacizumab療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ドセタキセル水和物	60～70 mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチニ	5～6 =AUC	点滴静注	day1
ベバシズマブ	15 mg/kg	点滴静注	day1

レジメン名：Weekly CDDP+RT療法

投与スケジュール：週1回を6コース（放射線療法中）

放射線併用

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
シスプラチニ	30～40 mg/m ²	点滴静注	day1,8,15,22,29,36

レジメン名：CBDCA単剤療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
カルボプラチニ	5～6 =AUC	点滴静注	day1

レジメン名：Nedaplatin単剤療法

投与スケジュール：4週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
ネダプラチニ	80～100 mg/m ²	点滴静注	day1

レジメン名：TP療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
パクリタキセル	67.5 mg/m ²	点滴静注	day1
パクリタキセル	67.5 mg/m ²	点滴静注	day1
シスプラチニ	50 mg/m ²	点滴静注	day2

レジメン名：CPT-P療法

投与スケジュール：4週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
イリノテカン塩酸塩水和物	60 mg/m ²	点滴静注	day1,8,15
シスプラチン	60 mg/m ²	点滴静注	day1

レジメン名：TC+bevacizumab+Pembrolizumab療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
パクリタキセル	175 mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチニ	5 =AUC	点滴静注	day1
ベバシズマブ	15 mg/kg	点滴静注	day1
ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注	day1

レジメン名：Cemiplimab単剤療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
セミプリマブ	350 mg/body	点滴静注	day1

レジメン名：TC(CBDCA脱感作) 療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
パクリタキセル	175～180 mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチニ	総量×0.001 mg/body	点滴静注	day1
カルボプラチニ	総量×0.01 mg/body	点滴静注	day1
カルボプラチニ	総量×0.1 mg/body	点滴静注	day1
カルボプラチニ	5～6 =AUC	点滴静注	day1
上記を除いた分			

レジメン名：TC+Bevacizumab療法(CBDCA脱感作) 療法

投与スケジュール：3週間毎

抗癌剤（一般名）	標準投与量	投与方法	投薬日
パクリタキセル	175～180 mg/m ²	点滴静注	day1
カルボプラチニ	総量×0.001 mg/body	点滴静注	day1
カルボプラチニ	総量×0.01 mg/body	点滴静注	day1
カルボプラチニ	総量×0.1 mg/body	点滴静注	day1
カルボプラチニ	5～6 =AUC	点滴静注	day1
上記を除いた分			
ベバシズマブ	15 mg/kg	点滴静注	day1

レジメン名：Etoposide単剤療法

投与スケジュール：4週間毎

抗癌剤（一般名）

エトポシド

標準投与量

50 mg/body

投与方法

経口投与

投薬日

day1～21