

+ 福岡赤十字病院がん化学療法レジメン一覧 改訂日：2025年11月17日

診療科：血液・腫瘍内科

癌種：同種造血幹細胞移植

レジメン名：FLU(125mg)+MEL(80-140mg)+TBI 2-4Gy(RIC)

投与スケジュール：

TBI 2～4Gy day-7～day-1のいずれかで施行

| 抗癌剤（一般名） | 標準投与量 | 投与方法 | 投薬日 |
|---------------|-------------------------|------|-------------|
| フルダラビンリン酸エステル | 25 mg/m ² | 点滴静注 | day-6～day-2 |
| メルファラン | 40～70 mg/m ² | 点滴静注 | day-3,day-2 |

レジメン名：FLU(150mg)+BU(12.8mg/kg)+TBI 4Gy (MAC)療法

投与スケジュール：

| 抗癌剤（一般名） | 標準投与量 | 投与方法 | 投薬日 |
|---------------|----------------------|------|----------|
| フルダラビンリン酸エステル | 30 mg/m ² | 点滴静注 | day-6～-2 |
| ブスルファン | 3.2 mg/kg | 点滴静注 | day-6～-3 |

レジメン名：FLU(90mg)+TBI 12Gy (MAC)療法

投与スケジュール：

| 抗癌剤（一般名） | 標準投与量 | 投与方法 | 投薬日 |
|---------------|----------------------|------|----------|
| フルダラビンリン酸エステル | 30 mg/m ² | 点滴静注 | day-6～-4 |

レジメン名：Flu+BU+Mel療法

投与スケジュール：

| 抗癌剤（一般名） | 標準投与量 | 投与方法 | 投薬日 |
|---------------|----------------------|------|----------|
| フルダラビンリン酸エステル | 30 mg/m ² | 点滴静注 | day-7～-2 |
| ブスルファン | 3.2 mg/kg | 点滴静注 | day-7～-4 |
| メルファラン | 40 mg/m ² | 点滴静注 | day-3,-2 |

レジメン名：High-dose CY療法(移植用)(50mg/kg)

投与スケジュール：

| 抗癌剤（一般名） | 標準投与量 | 投与方法 | 投薬日 |
|----------|-------|------|-----|
|----------|-------|------|-----|

レジメン名：High-dose CY療法(移植用)(40mg/kg)

投与スケジュール：

| 抗癌剤（一般名） | 標準投与量 | 投与方法 | 投薬日 |
|----------|-------|------|-----|
|----------|-------|------|-----|

レジメン名：High-dose CY療法(移植用 前処置)(60mg/kg)

投与スケジュール：

| 抗癌剤（一般名） | 標準投与量 | 投与方法 | 投薬日 |
|----------|-------|------|-----|
|----------|-------|------|-----|

レジメン名：短期MTX療法(GVHD予防)

投与スケジュール：

| 抗癌剤（一般名） | 標準投与量 | 投与方法 | 投薬日 |
|----------|-------|------|-----|
|----------|-------|------|-----|

レジメン名：Flu+CY+TBI2Gy療法

投与スケジュール：

| 抗癌剤（一般名） | 標準投与量 | 投与方法 | 投薬日 |
|---------------|----------------------|------|----------|
| フルダラビンリン酸エステル | 30 mg/m ² | 点滴静注 | day-6~-2 |
| シクロホスファミド水和物 | 14.5 mg/kg | 点滴静注 | day-6,-5 |